

Epiteliaalne munasarjavähk ja piirpahaloomulised munasarjatuumorid raseduse ajal*



Anu-Liis Laar –
Põhja-Eesti Regionaalhaigla
kirurgiakliiniku sünnitusabi ja
günekoloogia IV aasta arst-resident

Munasarjavähk raseduse ajal on harv ja keerukas olukord, mis pakub väljakutseid nii onkoloogilise ravi valikul kui ka raseduse jälgimisel. Andmeid selliste patsientide kohta on vähe.

Refereeritav rahvusvaheline retrospektiivne kohortuuring on sel teemal suurima patsientide arvuga. Uuring viidi läbi INCIP (*International Network on Cancer, Infertility and Pregnancy*) andmebaasi põhjal aastatel 1982–2019 registreeritud juhtumite põhjal. Uuring hõlmas 129 patsiendi andmeid, kellest 69-l (53%) oli diagnoositud piirpahaloomuline ja 60-l (47%) invasiivne munasarjavähk.

Raseduse ajal ei saanud ravi 47 (36%) patsienti, kirurgiliselt

koos või ilma keemiaravita raviti 64%. Haiguse retsidiivi risk oli suurem nendel naistel, kellel ei olnud haiguse levikut korrektselt hinnatud. Lastel, kelle emad said plaatinapõhist keemiaravi, oli oluliselt väiksem sünnikaal võrreldes nendega, kes keemiaravi ei saanud (2528 g vs. 3031 g, $p = 0,01$). Onkoloogiline ravitulemus oli parim neil rasedatel, keda raviti võimalikult sarnaselt mitterasedate naistega.

REFEREERITUD

Fruscio R, Trozzi R, Galimberti S, et al. Epithelial ovarian cancer and borderline tumors during pregnancy: a report from the International Network on Cancer, Infertility, and Pregnancy. *Int J Gynecol Cancer* 2024;35:100053.

* Ette kantud Põhja-Eesti Regionaalhaigla kirurgiakliiniku *Journal Club*'is 1. aprillil 2025.